Besi Sığırlarında Beslemenin Denetimi

Yemlik Yönetiminin Amacı

- Yem tüketimini en üst seviyeye taşımak ve artırmak, atılan ve bozulan yemi en aza indirmek için tutarlı/yeterli, besleyici değeri olan ve taze rasyonların verilmesi

İyi bir yemlik yönetiminin bulundurması gereken bazı özellikler

- Bölme numarası
- Sürü numarası
- Hayvan sayısı
- Bulunduğu CA grubu
- Şu anki CA değeri
- Yemi tükettiği gün sayısı
- Rasyonun uygulandığı gün sayısı
- Sağlam yemliklerin belirlenmesi
- Yemliklerin en son ne zaman temizlendiklerinin belirlenmesi
- Son 5-7 günlük süreçte yedirilen tahmini yem miktarı

Horton (1990)

Yemlik Skorlama Sistemi

- 4 puanlı skorlama sistemi kullanılmaktadır.

Pritchard (1993)

Yemlik Skorlama Sistemi

Skor	Tanımı
0	Yemlikte hiç yem yok
½	Eser düzeyde yem var. Yemliğin tabanı görülebiliyor.
1	Yemlik tabanı boyunca ince ve uniform yem katmanı var.
2	Yemin yaklaşık olarak % 25-50'si yemlikte bulunuyor.
3	Yemlikte düzensiz şekilde tepeleme şeklinde yem mevcut. Yemin %50'sinden fazlası yemlikte duruyor.
4	Yeme neredeyse hiç dokunulmamış. Yemin oluşturduğu tepecik hâlâ belirgindir.

Yemlik Skorlama 0 ve 1/2





Yemlik Skorlama 1 ve 2





Example Bunk Sheet

Feedlot:_____

Date	1		2		3		4		5		6		7	
Pen #	Days on Feed _____ Ration Number_____ *Pen Crashed*													
13	249	2	201	2	201	1/2	207	0	207	1/2	207	0	213	0
Pen #	Days on Feed _____ Ration Number_____ *Consistent*													
15	303	1/2	303	1/2	303	1/2	303	1/2	303	1/2	303	1/2	303	1/2
Pen #	Days on Feed _____ Ration Number_____ *Right on track*													
32	255	1/2	255	1/2	255	0	255	1/2	255	1/2	255	0	258	0
Pen #	Days on Feed _____ Ration Number_____ *Increasing DMI*													
35	237	1/2	237	1/2	237	1/2	237	1/2	237	1/2	240	0	246	0

Diğer yemlik yönetimi etmenleri

- Yemin sunulma şekli
  - Karıştırma
  - İşlenme (partikül boyutu)
  - Katkısız (uygun şartlarda)
- Besin madde içeriğinin uygunluğu
- Hava
  - Sıcaklık, çamur, yağmur, soğuk

Yemleme şeklinin besi performansına etkisi

Değişken	Öğün	Ad libitum
Süre (121 gün)		
CA	602 kg	603 kg
GCAA	1.74	1.74
KMT	23.57	26.39
YYO	6.15	6.90
Yemliklerin boş görülme sıklığı %,	69.3	39.7

Pritchard, 1997