

Güvercin ve Kumruların Beslenmesi








TÜRKİYE
2002
TR
№ 04892
POSTA GÜVERCİNİ









Güvercinlerin Beslenmesi



Güvercinlerin beslenme gereksinimleri yıl boyunca değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla güvercinlerin beslenmelerinde kullanılan tane yem karışımları da bu değişimlere uydurulmalıdır. Güvercinlerin yaşamında yıl boyunca görülen fizyolojik dönemler şunlardır:

1. Üreme ve yavru büyütme dönemi
2. Performans dönemi (uçuş, gösteri)
3. Tüy dökümü dönemi
4. Kış durgunluğu dönemi

İyi bir güvercin yemi karışımında proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller dengeli bir şekilde bulunmalıdır. Yem karışımlarında kullanılan taneler çimlenme yeteneklerini kaybetmemiş olmalıdırlar. Bu durum yem kalitesinin bir ölçüsüdür. Güvercin yemi karışımlarında kullanılabilecek yemler ve besin madde içerikleri çizelgelerde verilmiştir.

Güvercinlerin Beslenmesi

Baklagiller

Bu yemler proteince zengin yemlerdir. Protein gereksinimi büyüme ve tüy değiştirme döneminde artar.

Yem	Protein, %	Karbonhidrat, %	Yağ, %	Selüloz, %
Fasulye	25,4	48,2	1,5	7,1
Mercimek	22,0	50,4	1,2	3,5
Bezelye	22,9	53,1	1,2	6,1
Soya Fasulyesi	35,7	27,5	17,0	4,8
Fiğ	23,0	50,2	1,5	6,0

Güvercinlerin Beslenmesi

Tahıllar

Bu yemlerde ağırlıklı olarak karbonhidrat bulunur. İyi yem karışımların temel kısmını oluştururlar.

Yem	Protein, %	Karbonhidrat, %	Yağ, %	Selüloz, %
Yulaf	11,2	63,6	5,2	10,2
Darı	10,5	65,2	3,5	1,8
Buğday	13,2	67,7	2,0	1,8
Mısır	7,1	67,0	4,0	2,2
Arpa	10,4	66,3	1,8	4,5

Güvercinlerin Beslenmesi

Yağlı Tohumlar

Kısmen proteince zengin yağlı tohumlardır. Karışımlara az miktarda katılmalıdırlar. Fazla verilmeleri zararlıdır.

Yem	Protein, %	Karbonhidrat, %	Yağ, %	Selüloz, %
Kenevir	19,3	17,9	32,2	16,6
Kanola	19,9	16,8	44,2	6,3
Keten	23,3	21,6	30,8	9,4

Güvercinlerin Beslenmesi

Aşağıdaki tabloda güvercin yemi karışımlarında hangi yemlerin ne oranlarda bulunmalarının uygun olacağı gösterilmiştir.

Yem	Ortalama	En Az	En Fazla
Fasulye	% 10	% 5	% 25
Mercimek	% 10	% 5	% 30
Bezelye	% 10	% 5	% 25
Soya Fasulyesi	% 6	% 4	% 15
Fiğ	% 40	% 10	% 70
Yulaf	% 20	% 5	% 40
Darı	% 10	% 5	% 20
Buğday	% 8	% 5	% 20
Mısır	% 5	% 2	% 10
Arpa	% 5	% 1	% 25
Kenevir	% 2	% 1	% 5
Kolza	% 2	% 1	% 6
Keten	% 5	% 1	% 10

Güvercinlerin Beslenmesi

Güvercin başına verilecek yem miktarı, canlı ağırlıkları dikkate alınarak küçük ırklarda ortalama 20-30 g, orta büyüklükte ırklarda 35-50 g ve büyük yada ağır ırklarda 40-60 g'dır.

Yem karışımındaki tüm tanelerin yenmelerini sağlamak amacıyla günde iki kez yemleme tavsiye edilmektedir. Verilen yem kuşlar tarafından 15-20 dakikada tüketilmelidir. Eğer bu süre sonunda halen yemlikte yem kalıyorsa yem miktarı biraz azaltılmalıdır.

Yem tüketimini bulmanın diğer bir pratik yolu onları bir gün aç bırakıp daha sonra yiyebildikleri kadar yem vermektir. Açken bir seferde yenen miktarın 1/3'ü sabah, kalan 2/3'ü ise akşam verilmelidir. Buna karşın yeni yem yemeye başlayan yavruların önünde yem sürekli bulundurulmalıdır. Yavrular büyüdükçe haftadan haftaya yem miktarı azaltılmalı ve bunun sonunda yavrularda da günde iki kez yemlemeye geçilmelidir.

Güvercinlerin Beslenmesi

Tüm hayvanlarda olduğu gibi güvercinlerde de yem miktarı ve dengeli beslenme çok önemlidir. Özellikle kapalı koşullarda yetiştirilen kuşların her zaman önlerinde yemin bulundurulması kuşların yağlanmasına neden olur. Yağlanma kuşlarda üreme problemlerine yol açabildiği gibi özellikle uçucu kuşlarda uçuş performansını olumsuz olarak etkilemektedir.



Kumruların Beslenmesi











