

Tarantulaların Beslenmesi

Giriş

Tarantulalar veya kuş yiyen örümcekler olarak da bilinen *Theraphosidae* familyasının örümcekleri, esaret altında yaygın olarak tutulan araknidlerin önemli bir grubunu temsil eder.

Bu familyada yaklaşık 900 tür bulunmaktadır. Evcil hayvan ticaretinde ve zoolojik koleksiyonlarda sergi olarak giderek daha popüler hale gelmektedirler.

Bu hayvanlar, bazı türlerde dişiler için 30 yıldan fazla bir yaşam süresiyle uzun ömürlü olabilir; bu durum bazı hayvan sahiplerinin hayvanlarına duygusal olarak bağlı hale gelmesi ve veteriner hekimlerin onları tedavi etmeye istekli olması gerektiği anlamına gelir.

Giriş

Çoğu erkek yaklaşık 3-4 yıl yaşar ve genellikle terminal evrelerinden bir kez birkaç ay sonra ölür.

Esaret altında, erkek terminal dönemi sekiz aya kadar uzayabilir ve nadiren 18 aya kadar hayatta kalabilir. Çok nadiren, erkek bir tarantula postterminal tüy dökmeye sahip olur, ancak üreme yeteneklerini kaybeder.

Yetiştirme-Besleme

Terraryum/insektaryum boyutu türe bağlıdır ve genişlik ve yükseklik olarak tüm boyutlar dikkate alınmalıdır.

30 cm yükseklikten düşme bile ölümcül opisthosoma travmasına neden olabilir. Goliath kuş yiyici gibi daha ağır örümcekler daha hassastır, bu nedenle yüksekliği 30 cm'nin altındaki terraryumlar tavsiye edilir.

Karasal tarantulaların ayaklarında kancalar vardır, bu nedenle ağ üstü terraryumlar önerilmez; pençeler meş uzuvlarına sıkışırsa ototomi meydana gelebilir.

Pembe parmaklı tarantulalar, arboreal bir tür oldukları için daha yüksek terraryumlara gereksinim duyar.



Yetiştirme-Besleme

Tarantulalar fotofobiktir ve ek aydınlatma gerektirmez.

Tarantula türlerinin çoğu için önerilen sıcaklık aralıkları 20-30°C arasındadır ve çevresel sıcaklıkların yakından izlenmesi için maksimum-minimum sıcaklık değerlerini gösteren bir termometre tavsiye edilir.

Ek ısıya ihtiyaç duyulursa, terraryumun bir kısmının dışına termostatik kontrollü bir ısı matı yerleştirilebilir, mat bir tarafta yer almalı, asla tabana yerleştirilmemelidir.

Yetiştirme-Besleme

Tahriş ve strese neden olabileceğinden, tarantulalara hafif bir su sisi indirekt olarak püskürtülmelidir.

Bunun yerine, Goliath kuş yiyici ve pembe parmaklı tarantula gibi daha yüksek nem gerektiren türler için alt tabaka nemlendirilmelidir.

Sığ bir tabakta sağlanan su her zaman bulunmalıdır.

Yetiştirme-Besleme

Cırcır böcekleri ve çekirgeler gibi omurgasızlar örümceğin ana diyeti olmalıdır; bunlar, optimum besin içeriği sağlamak için aç bırakılmamalı, beslenmelidir.

Balmumu kurtları, yüksek yağ içeriği ve düşük besin değeri nedeniyle kısıtlı verilmelidir.

Bazı daha büyük türler, fareler gibi bütün olarak öldürülmüş omurgalıları kabul edebilir.

Diğer hayvanların aksine tarantulaların kalsiyum takviyesine ihtiyacı yoktur. Örümceklerin dış iskeletlerinde kalsiyum karbonat bulunmaz.